ekosolfarm
Solucan Gübresi
ORGANİK GÜBRE



Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...



Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.
Hacırahmanlı Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi
No:7 Saruhanlı / Manisa / TÜRKİYE
Tel: +90 236 606 06 10 / +90 539 680 98 80
Mail: info@ekosol.com.tr
www.ekosol.com.tr | shop.ekosol.com.tr

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ORGANİK TARIM TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CERES CERTIFIED

Solucan Gübresi / Wormcasting
Liquid Worm Fertilizer Nedir?

Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanlarının gübresinden elde edilen, Sıvı ve Katı formda EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi® sebze, meyve ve bitkinin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar.

*Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı **mikroorganizmalar**, **azot fikse eden bakteriler**, mikorizal mantarlar, doğal büyüme **hormonları**, amino asitler, enzimler, toprak kaynaklı patojen (hastalık yapan) mikroorganizmalara karşı etkili **40'tan fazla antimikrobiyal** etki gösteren madde bulunur.*

*Bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlayan **makro, mikro, iz elementlerden** oluşan bitki besinlerini içerir. Topraktaki alınamayan bitki besin elementlerini alınabilir forma dönüştürür.*
Ürün miktarında artış sağlar.

***EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi®**nin gerek Katı (granül), gerekse Sıvı formülasyonlarının topraktan ve yapraktan uygulamaları ile önemli bitki hastalık etmeni fungus (mantar) ve bakterilerin oluşturduğu bakteriyal ve fungal hastalıklara karşı önleyici etki göstererek bitkiyi hastalıklara karşı korur.*

*Solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını **(Sölom Sıvısı)** gübreye geçirir ve bu sıvı; bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar.*

Bitki hücre duvarlarının kalınmaşmasını sağlayarak, emici tip ağız yapısına sahip böceklerin (meyve sinekleri, aphids vs.) bitki dokusunu delerek bitki özünü içmesini engelleyerek, zararlarına karşı bitkiyi korur.

Kompostlaşmış biyotik etmenlerin Solucan Gübresinde bulunması sebebiyle bitkinin büyümesine etken olan proteinli (azotlu) bileşikler içerir.

İşte Mucizenin Tanımı Budur!

*Hem mikroorganizmalar, hem enzimler, hem bitki besin elementleri, hem de Sölom Sıvısı sayesinde; toprağı organik maddece zenginleştiren, pH dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren, **EkosolFarm % 100 Organik Solucan Gübresi®** sayesinde **dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.***





- ✓ *Ayrım gözetmeksizin **her türlü tarım kültüründe** uygulanır.*
- ✓ *Bitkide direnç, hızlı **büyüme** ve **gelişme**, üründe **erkencilik** sağlar.*
- ✓ *Verim artışı sağlar.*
- ✓ *Bitkide **kök gelişimini** hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün **güçlü** olmasını sağlar.*
- ✓ *Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri **Sölom** sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı **direnç** sağlar.*
- ✓ *Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Bitkinin **hastalıklara karşı direncini** arttırır.*
- ✓ *İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin **uzun süre** beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.*
- ✓ *Topraktaki **mikroorganizma** faaliyeti hızlanır.*

✓ *Gerçek **lezzet** ve **aromaya** sahip ürün yetiştirilmesini sağlar*



ekosolfarm Solucan Gübresi ORGANİK GÜBRE
www.ekosol.com.tr
shop.ekosol.com.tr
facebook/EkosolFarm

EkosolFarm Organik Solucan Gübresi® Wormcasting

Kullanım Şekil ve Miktarları

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak kullanılması tavsiye edilir.

BİTKİ ÇEŞİDİ	UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI	KULLANIM DOZU
SEBZELER		
Meyvesi Yenenler		
Domates/Biber(Dolmalık,Sivri,Salçalık)/Patlıcan	Toprak hazırlığında serpme şeklinde toprak altına	60-80 Kg/Dekar
Kabak/Hıyar/Acur/Taze Fasülye/Taze Bezelye	Fide Yastığına, Tohum Yatağına	5 Kg/metre kareye
Taze Bakla/Börülce/Bamya/Balkabağı	Dikim öncesi sıra üzeri bant şeklinde uygulamada	50-70 Kg/Dekar
Çekirdeklik Kabak/Kavun/Karpuz	Dikim sonrası kök bölgesine çizi şeklinde	40-60 Kg/Dekar
Yaprağı Yenenler		
Lahanalar/Ispanak/Pazı/Semizotu/Marul	Toprak hazırlığında serpme şeklinde toprak altına	50-60 Kg/Dekar
Salatalar/Brüksel Lahanası/Ebegümeci	Fide Yastığına, Tohum Yatağına	5 Kg/metre kareye
Maydanoz/Roka/Tere/Nane/Dereotu/Hindiba	Dikim öncesi sıra üzeri bant şeklinde uygulamada	40-50 Kg/Dekar
	Dikim sonrası kök bölgesine çizi şeklinde	30-40 Kg/Dekar
Sürgünleri, Yaprak Sapları, Çiçek ve Çiçek Tablası Yenenler		
Kuşkonmaz/Ravent/Yaprak ve Sap Kereviz	Toprak hazırlığında serpme şeklinde toprak altına	50-70 Kg/Dekar
Enginar/Karnabahar/Brokoli	Fide Yastığına, Tohum Yatağına	5 Kg/metre kareye
	Dikim öncesi sıra üzeri bant şeklinde uygulamada	40-60 Kg/Dekar
	Dikim sonrası kök bölgesine çizi şeklinde	30-50 Kg/Dekar
Kuru ve Taze Tohumları Yenenler		
Kuru Fasülye/Bezelye/Barbunya/Bakla	Toprak hazırlığında serpme şeklinde toprak altına	50-70 Kg/Dekar
Börülce/MercimekNohut/Tatlı Mısır	Dikim öncesi sıra üzeri bant şeklinde uygulamada	40-60 Kg/Dekar
	Dikim sonrası kök bölgesine çizi şeklinde	30-50 Kg/Dekar
Soğan ve Sürgünleri Yenenler, Yumruları Yenenler, Kökleri Yenenler		
Sarımsak/Soğan/Pırasa	Toprak hazırlığında serpme şeklinde toprak altına	50-60 Kg/Dekar
Patates/Tatlı Patates/Yer Elması	Dikim öncesi sıra üzeri bant şeklinde uygulamada	40-50 Kg/Dekar
Havuç/Turp/Kırmızı Pancar/Şalgam/Kök Kereviz		
MEYVELER		
Yumuşak Çekirdekliler		
Elma/Armut/Ayva/Alıç/Muşmula/Üvez Kuşburnu (Yeni dikim)	Dikim esnasında, fidan çukuruna, kök ile temas edecek şekilde uygulanır.	1,5-2 Kg/Fidan
Elma/Armut/Ayva/Alıç/Muşmula/Üvez Kuşburnu	Yaprak, Taç iz düşümüne, kök bölgesine, 15 cm en, 15 cm derinlikte çember şeklinde açılacak çukura, gölge çapı kadar gübre uygulanır. Gölge Çapı 2 metre ise 2 kg veya kök bölgesine diskaro ile toprak altına ağaç başı yine aynı oranda gübre gelecek şekilde uygulanır.	Gölge Çapı = Kg
Taş Çekirdekliler		
Kiraz/Vişne/Kayısı/Şeftali/Erik/Kızılcık/İğde Nektarin (Yeni Dikim)	Dikim esnasında, fidan çukuruna, kök ile temas edecek şekilde uygulanır.	1,5-2 Kg/Fidan
Kiraz/Vişne/Kayısı/Şeftali/Erik/Kızılcık/İğde Nektarin	Yaprak, Taç iz düşümüne, kök bölgesine,15 cm en, 15 cm derinlikte çember şeklinde açılacak çukura, gölge çapı kadar gübre uygulanır. Gölge Çapı 2 metre ise 2 kg veya kök bölgesine diskaro ile toprak altına ağaç başı yine aynı oranda gübre gelecek şekilde uygulanır	Gölge Çapı = Kg
Sert Kabuklular		
Badem/Ceviz/Kestane/Fındık/Antep Fıstığı (Yeni Dikim)	Dikim esnasında, fidan çukuruna, kök ile temas edecek şekilde uygulanır.	1,5-2 Kg/Fidan
Badem/Ceviz/Kestane/Fındık/Antep Fıstığı	Yaprak, Taç iz düşümüne, kök bölgesine,15 cm en, 15 cm derinlikte çember şeklinde açılacak çukura, gölge çapı kadar gübre uygulanır. Gölge Çapı 2 metre ise 2 kg veya kök bölgesine diskaro ile toprak altına ağaç başı yine aynı oranda gübre gelecek şekilde uygulanır.	Gölge Çapı = Kg
Üzümsü Meyveler		
Üzüm/Kivi/Dut/İncir/Nar (Yeni Dikim)	Dikim esnasında, fidan çukuruna, kök ile temas edecek şekilde uygulanır.	1-1,5 Kg/Asma
Üzüm/Kivi/Dut/İncir/Nar	Yaprak, Taç iz düşümüne, kök bölgesine,15 cm en, 15 cm derinlikte çember şeklinde açılacak çukura, gölge çapı kadar gübre uygulanır. Gölge Çapı 2 metre ise 2 kg veya kök bölgesine diskaro ile toprak altına ağaç başı yine aynı oranda gübre gelecek şekilde uygulanır.	Gölge Çapı = Kg
Ahududu/Böğürtlen Yeni dikim	Dikim esnasında, fidan çukuruna, kök ile temas edecekşekilde uygulanır.	1-1,5 Kg/Bitki
Ahududu/Böğürtlen	Kök bölgesine diskaro ile veya çapa ile toprak altına bitki başı	1,5-2 Kg/Bitki
Çilek	Dikim Öncesi her fide çukuruna	25-30 gr/Fide

- √ Yabancı ot tohumu içermez
- √ Toprağın yapısını ve pH'ını düzenlemeye, su tutma ve havalandırma kapasitesini arttırmaya yardımcı olur.
- √ Toprağın biyolojik ve fiziksel yapısını düzenler ve iyileştirir.
- √ Tüm uygulama dozları ortalama değerlerdir.
- √ Yakma özelliği olmadığı için tüm bitkilerinizde doğrudan kök ile temas ettirerek güvenle kullanabilirsiniz

USDA ORGANIC





BİTKİ ÇEŞİDİ	UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI	KULLANIM DOZU
Turunçgiller		
Portakal/Limon/Mandalina/ Greyfurt/Mandarin/(Yeni Dikim)	Dikim esnasında, fidan çukuruna, kök ile temas edecek şekilde uygulanır.	1,5-2 Kg/Fidan
Portakal/Limon/Mandalina Greyfurt/Mandarin	Yaprak, Taç iz düşümüne, kök bölgesine, 15 cm en, 15 cm derinlikte çember şeklinde açılacak çukura, gölge çapı kadar gübre uygulanır. Gölge Çapı 2 metre ise 2 kg veya kök bölgesine diskaro ile toprak altına ağaç başı yine aynı oranda gübre gelecek şekilde uygulanır.	Gölge Çapı = Kg
Akdeniz Meyveleri		
Zeytin (Yeni Dikim)	Dikim esnasında, fidan çukuruna, kök ile temas edecek şekilde uygulanır.	1,5-2 Kg/Fidan
Zeytin	Yaprak, Taç iz düşümüne, kök bölgesine, 15 cm en, 15 cm derinlikte çember şeklinde açılacak çukura, gölge çapı kadar gübre uygulanır. Gölge Çapı 2 metre ise 2 kg veya kök bölgesine diskaro ile toprak altına ağaç başı yine aynı oranda gübre gelecek şekilde uygulanır.	Gölge Çapı = Kg
İncir/Trabzon Hurması Yeni DünyaZerdali(Yeni Dikim)	Dikim esnasında, fidan çukuruna, kök ile temas edecek şekilde uygulanır.	1,5-2 Kg/Fidan
İncir/Trabzon Hurması Yeni Dünya/Zerdali	Yaprak, Taç iz düşümüne, kök bölgesine, 15 cm en, 15 cm derinlikte çember şeklinde açılacak çukura, gölge çapı kadar gübre uygulanır. Gölge Çapı 2 metre ise 2 kg veya kök bölgesine diskaro ile toprak altına ağaç başı yine aynı oranda gübre gelecek şekilde uygulanır	Gölge Çapı = Kg
Muz (Yeni Dikim)	Dikim esnasında dikim yalağına uygulanır.	2-2,5 Kg/Kök
Muz	Kök doğum bölgesine	3-4 Kg/Ağaç
TARLA BİTKİLERİ		
Buğday/Arpa/Yulaf / Çavdar Trikale/Darılar / Mısır	Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır .	50-60 Kg/Dekar
Çeltik	Toprak hazırlığında toprak altına veya tavalara serpme şeklinde uygulanır	50-60 Kg/Dekar
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER		
Ayçiçeği/Soya/Kanola/Yer fıstığı Susam/Aspir/Yağ Keteni/Hint Yağı Pamuk/Lif Keteni/Kenevir Rami/Hibiskus/Şeker Pancarı/Kapok	Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.	60-70 Kg/Dekar
Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri		
Tütün/Haşhaş/Yağ Gülü/Anason Kimyon/Kekik/Adaçayı Lavanta/Safran/Kapari	Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.	50-60 Kg/Dekar
Çay/Defne/Şerbetçi Otu (Yeni Dikim)	Dikim esnasında, fidan çukuruna, kök ile temas edecek şekilde uygulanır.	1-2 Kg/Kök
Çay/Defne/Şerbetçi Otu	Serpme Şeklinde	4-5 Kg/Kök
Çayır Mera ve Yem Bitkileri/Yonca	Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.	40-50 Kg/Dekar
İÇ VE DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ VE YETİŞTİRİCİLİKTE		
Kesme Çiçekçilikte Süs Bitkileri	Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır. Saksı harcı hazırlığında kullanılacak harca %40-50 oranında karıştırılarak uygulanır.	60-70 Kg/Dekar
Çiçekli iç mekan bitkileri(saksı)	Saksı harcı hazırlığında kullanılacak harca %40-50 oranında karıştırılarak uygulanır.	100-125 gr/saksı
Çim	Önerilen dozlarda serperek uygulanır.	100-125 Kg/Dekar
Fide ve Fidan Yetiştiriciliğinde	Kullanılacak Harca %40-%50 oranında karıştırılarak uygulanır.	

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak kullanılması tavsiye edilir.

EkosolFarm Organik Solucan Gübresi® (EkosolFarm Wormcasting®)
TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik'e uygunluğu, TR-OT-35 yetki numaralı CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır.
Sertifika No: TR-OT-35

EkosolFarm Organik Solucan Gübresi® (EkosolFarm Wormcasting®)
CERES GmbH confirms that EkosolFarm® Wormcasting Fertilizer can bu used in organic farming according the following standarts.
.REG. (EC) 889/2008 (ANNEX I) .NOP (§205.105)

EkosolFarm Organik Solucan Gübresi® (EkosolFarm Wormcasting®)
Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. Tic. AŞ. tarafından,T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğine uygun üretilmiştir.
Çalışma İzin Numarası: TR-45-OG-002

EkosolFarm Organik Solucan Gübresi® (EkosolFarm Wormcasting®)
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 23.02.2018 tarihli ve 30341 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarımda kullanılan organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelere dair yönetmelik kapsamındatescil ve lisans belgesi düzenlenmiştir. Lisans No: 1304 Tescil No: 11216

Garanti Edilen İçerik

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	BİRİM	ANALİZ SONUÇLARI
Organik Madde	%	35
Toplam Azot	%	1,2
Organik Azot	%	1
Maksimim Nem	%	35
C/N	%	14
Toplam Hümik+Fülvik Asit	%	20
pH Aralığı		6,5 - 8,5
EC (ds/m) Max		5



www.ekosol.com.tr | shop.ekosol.com.tr | facebook.com/EkosolFarm



EkosolFarm Organik Sıvı Solucan Gübresi® - Liquid Worm Fertilizer Kullanım Şekil ve Miktarları

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak kullanılması tavsiye edilir.

SEBZELER	UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI		KULLANIM DOZU
Domates / Patlıcan / Kabak	Fide viyollerini gübreli suya bandırma metodu	Bandırma	100 Litre suya 1 Lt.
Acur / Taze Fasülye / Hıyar	Vejetatif kök gelişim döneminde 15 gün arayla 3 kez	Damla Sulamadan	400-450 cc/Dekar
Biber(Dolmalık,Sivri,Salçalık)	Çiçeklenme veya tohura kalkma döneminde 1 kez	Yapraktan	300-350 cc/Dekar
Taze Bezelye /Taze Bakla	Çiçeklenme veya tohura kalkma döneminin	Damla Sulamadan	400-450 cc/Dekar
Börülce / Bamya / Balkabağı	ikinci periyodunda 15 gün arayla 2 kez	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
Çekirdeklik Kabak	Meyveyi büyütme döneminde 2 kez		
Kavun / Karpuz			
Yaprağı , Sürgünleri, Sapları ve Çiçek Tablası Yenenler			
Lahanalar / Ispanak / Pazı			
Semizotu / Marul /Salatalar	Fide viyollerini gübreli suya bandırma metodu	Bandırma	100 Litre suya 1 Lt.
Brüksel Lahanası / Enginar	Vejetatif kök gelişim döneminde	Damla Sulamadan	1 Lt. / Dekar
Maydanoz /Roka / Tere / Nane	Yaprak ve meyve gelişim döneminde	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
Dereotu / Kuşkonmaz / Brokoli	15-20 gün arayla 3 kez		
Yaprak-Sap Kereviz/Karnabahar			
Kuru ve Taze Tohumları Yenenler			
Kuru Fasülye / Bezelye / Bakla	İri tohumlarda 100 kg. tohuma	Tohum Islama	500 cc.
Barbunya/Börülce / Mercimek	Ufak Tohumlarda 100 kg. tohuma	Tohum Islama	350 cc.
Nohut / Tatlı Mısır	Vejetatif kök gelişim döneminde	Damla Sulamadan	1 Lt. / Dekar
	Çiçeklenmeden önce 1 kez ve 20 gün sonra	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
Nohut	Nohutta tohum ıslamada 500 cc ve 1 kezde ilaçlama esnasında 350 cc/dekar kullanılır.		
Soğan ve Sürgünleri ,Yumruları , Kökleri Yenenler			
Sarımsak / Soğan / Pırasa			
Patates/Tatlı Patates /Yer Elması	Vejetatif kök gelişim döneminde	Damla Sulamadan	350-400 cc/Dekar
Havuç/Turp/Kırmızı/Pancar	Bitkiler 20-25 cm.'de iken ve 15 gün ara ile 2 kez	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
Şalgam/Kök Kereviz			



Önemli hatırlatma: Damla Sulama yok ise damla sulama için verilen dozlar aynı dönemlerde yapraktan uygulanır.

MEYVELER	*Yumuşak / Taş Çekirdekliler / Sert Kabuklular / Üzümsü Meyveler*		
Elma/Armut/Ayva/Alıç/Muşmula			
Üvez / Kuşburnu /Kiraz /Vişne	Ağaca su yürümesi başladıktan 10 gün sonra	Damla Sulamadan	1-1,5 Lt. / Dekar
Kayısı/Şeftali/Erik/Kızılcık/İğde	Çiçeklenme döneminde	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
Nektarin/Badem/Ceviz/Kestane	Meyve tutumunda	Yapraktan	400-450 cc/Dekar
Fındık/Antep Fıstığı/Üzüm /Kivi	Meyve İrileştirme Döneminde	Yapraktan	400-450 cc/Dekar
Dut/İncir/Nar/Ahududu/Böğürtlen			
Çilek	Dikimden 10 gün sonra	Damla Sulamadan	1-1,5 Lt. / Dekar
	Bitki 4-5 Yaprakta iken	Damla Sulamadan	350-400 cc/Dekar
	Meyve Tutumunda Çiçekte	Yapraktan	400-450 cc/Dekar
	Meyve Döneminde	Yapraktan	400-450 cc/Dekar

Tüm bitkilerde kullanım miktarları ve detaylı kullanım kılavuzu için: www.ekosol.com.tr

EkosolFarm Sıvı Organik Solucan Gübresi® (EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)
Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. tarafından T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 23 Şubat 2018 tarihli ve 30341 sayılı Tarımda kullanılan organik ve mikrobiyal kaynaklı gübrelere dair yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.
Lisans No: 1304 Tescil No: 11217

EkosolFarm Sıvı Organik Solucan Gübresi® (EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)
Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. Tic. AŞ. tarafından,T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğine uygun üretilmiştir.
Çalışma İzin Numarası: TR-45-OG-002

EkosolFarm Organik Sıvı Solucan Gübresi® - Liquid Worm Fertilizer Kullanım Şekil ve Miktarları

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak kullanılması tavsiye edilir.

Turunçgiller/Akdeniz Meyveleri	*UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI*		*KULLANIM DOZU*
Portakal / Limon / Mandalina /	Su yürümesi başladıktan10 gün sonra	Damla Sulamadan	1 -1,5 Lt. /Dekar
Greyfurt /Mandarin /	Çiçeklenme döneminde	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
Zeytin / İncir / Zerdali /	Meyve tutumunda	Yapraktan	400-450 cc/Dekar
Trabzon Hurması / Yeni Dünya	Meyve İrileştirme Döneminde	Yapraktan	400-450 cc/Dekar
Muz	Vejetatif kök gelişim döneminde	Damla Sulamadan	1 -1,5 Lt. /Dekar
	Kök doğum döneminde	Yağmurlamadan	500 cc / Dekar
	Meyve Oluşum Döneminde	Damla Sulamadan	1 -1,5 Lt. /Dekar
	Meyve Doluluk Döneminde	Yağmurlamadan	500 cc / Dekar

Önemli hatırlatma: Damla Sulama yok ise damla sulama için verilen dozlar aynı dönemlerde yapraktan uygulanır.

TARLA BİTKİLERİ			
Buğday / Arpa / Yulaf / Çavdar/	İri tohumlarda 100 kg. tohuma	Tohum Islama	500 cc.
Tritikale / Darılar / Mısır	Ufak Tohumlarda 100 kg. tohuma	Tohum Islama	350 cc.
	Kardeşlenme döneminde	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
	Sapa Kalkma Döneminde	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
	Meyve oluşum döneminde	Yapraktan	400-450 cc/Dekar
Çeltik	1 ton tohum için	Tohum Islama	5 Lt.
	Mantar İlacı ile beraber her seferinde	Yapraktan	400-450 cc/Dekar
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER			
Ayçiçeği / Soya / Kanola	İri tohumlarda 100 kg. tohuma	Tohum Islama	500 cc.
Yer fıstığı/Susam/Aspir/Pamuk	Ufak Tohumlarda 100 kg. tohuma	Tohum Islama	350 cc.
Lif Keteni / Kenevir /Kapok	Bitki 4-5 Yaprakta iken	Yapraktan	400-450 cc/Dekar
Şeker Pancarı / Hint Yağı	Her 20 günde bir	Yapraktan	400-450 cc/Dekar
Yağ Keteni			
Pamuk	Kök gelişiminde ve başak oluşumunda1Lt./dekar (damlamadan) 2. çapa ve ilk böcek ilaçlamasında 450-500 cc/dekara (yapraktan)		
Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri			
Tütün	Fide Yataklarına	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
	Dikim sonrası bitki 8-10 yaprakta	Damla Sulamadan	1 Lt./Dekar
	İlk Kırım öncesi	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
	İlk Kırım'dan hemen sonra	Damla Sulamadan	1 Lt./Dekar
	Her kırım arası	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
Haşhaş / Yağ Gülü / Anason			
Kimyon / Kekik/Adaçayı	İlk yaprakların oluştuğu dönemde	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
Lavanta / Safran / Kapari	Her 20 günde 1 kez	Yapraktan	350-400 cc/Dekar
Defne / Şerbetçi Otu			
Çay	Her Sürgünde	Yapraktan	2 Lt. / Dekar
Çayır Mera ve Yem Bitkileri	İlk yaprak oluştuğu dönemde her 20günde1kez Yapraktan 350-400 cc/Dekar		
İÇ VE DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ - YETİŞTİRİCİLİKTE			
Çim	Her biçimden sonra	Yağmurlama ile	400-450 cc/Dekar
Fide Yetiştiriciliğinde	İlk yaprakların oluştuğu dönemde	Yapraktan	50-400 cc/Dekar
Fidan Yetiştiriciliğinde	Erken baharda ve her 20 günde bir	Damla Sulamadan	2 Lt. / Dekar

Tüm bitkilerde kullanım miktarları ve detaylı kullanım kılavuzu için: www.ekosol.com.tr

Approved by CERES GmbH for use it organic production according to NOP Final Rule and Regulation EC 834/07

EkosolFarm Sıvı Organik Solucan Gübresi® (EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)
T.C. Gıda ve Tarım Bakanlığınca düzenlenen Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'e uygunluğu,
TR-OT-35 yetki numaralı CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır.
Sertifika No: TR-OT-35


Garanti Edilen İçerik

Garanti Edilen İçerik	Birim	Miktar
Organik Madde	%	7
Toplam Azot (N)	%	1
Organik Azot	%	0,2
pH Aralığı		8,5 -10,5
EC (dS/m) max.		10

Approved by CERES GmbH for use it organic production according to NOP Final Rule and Regulation EC 834/07

EkosolFarm Sıvı Organik Solucan Gübresi® (EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)
CERES GmbH confirms that EkosolFarm® Liquid Worm Fertilizer can be used in organic farming according the following standarts EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer REG. (EC) 889/2008 (ANNEX I) .NOP (§205.105)

** EkosolFarm %100 Organik Katı Solucan Gübresi®*
Kök tutumu ve gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir.
**Uygulama dozajları yaklaşık oranlarda verilmiştir. Bitki sayısına, damlama ve püskürtme debisine göre değişiklik gösterebilir.



www.ekosol.com.tr | shop.ekosol.com.tr | facebook.com/EkosolFarm